

Приложение на PRP в съвременната Ревматология



**АНАСТАС БАТАЛОВ,
ПЛАМЕН ТОДОРОВ**

**МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
РЕВМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА, МБАЛ - КАСПЕЛА**

Дефиниция на продукта



- PRP – богата на тромбоцити плазма
- Автоложен продукт - обем от плазма със съдържание на Thр, по-високо от нормалното
- Увеличена концентрацията на Thр и растежни фактори до 500%, и пролиферацията на hMSC (човешки стволови клетки)

Философията на това ново лечение



- да се комбинират новите технологии с естествените възможности на тялото да се самоизлекува
- PRP терапията предлага много добро решение по отношение на ускоряването на оздравителния процес при някои заболявания, като пациентът не е подложен на осезаем риск

Ролята на Тромбоцитите



- когато се активират, Th ρ освобождават протеини, наречени фактори на растежа. Съществуват множество фактори на растежа, отговарящи за различни процеси, но може да се каже, че всички те ускоряват оздравяването на засегнатите тъканите.
- повишавайки концентрацията на Th ρ , ние можем да осигурим мощен „коктейл“ от фактори на растежа, които осезаемо да ускорят процеса на оздравяване на засегнатата тъкан.
- в PRP обаче има и някои протеини с проинфламаторен ефект, които днес могат да бъдат селективно отстранени и по този начин да се повиши антиинфламаторният ефект и да се намали болката.

Растежни фактори



- Концентрацията на растежни фактори не е пропорционална на концентрацията на Thg и много вариабилна между различните пациенти - вариабилност в резултатите.
- Алфа гранулите на Thg съдържат около 200 протеина.
- Основно значение за възстановяване на увредените тъкани имат: PDGF, TGF, VEGF, IGF-1, EGF.
- Те стимулират клетъчната миграция, пролиферация и диференциация (фибробласти, остеобласти, мезенхимни стволови клетки), ангиогенезата и синтеза на матрикс.

Фази на възстановителния процес



- След като е настъпила активация на Th γ на мястото на инжектиране, отделените растежни фактори предизвикват **локално възпаление**, което продължава около 3 дни
- В последствие на място се натрупват фибробласти, което маркира **пролиферативната фаза** на оздравителния процес. Той продължава около 6 седмици.
- След това настъпва **ремоделиране на положения колагенов матрикс**, което продължава около 6 месеца
- Завършва с изграждането на **зряла нормална тъкан**

Заболявання, лекувани с PRP



Горен крайник



- **Рамо:**

тендинит или руптура на ротаторния маншон, тендинит на дългата глава на бицепс брахии, разкъсвания на лабрума, ставна нестабилност

- **Китка/ръка:**

ОА, болест на DeQuervaine, други тендинити на гривнена става или пръсти, руптури на лигаменти или нарушена функция на пръстите на ръката

- **Лакътна става:**

Медиален и латерален епикондилит

Долен крайник



- **Тазобедрена става:**

Тендинит на трактус илиотибиалис (ITB Syndrome), тендинит и бурсит на м. псоас, бурсит на трохантер майор, Пириформис синдром, нарушена функция на сакро-илиачните стави, ОА

- **Коляно:**

Тендинит на ligamentum patellae proprium, Patellar Femoral Syndrome, хондромалация на пателата, частично разкъсани или разтегнати лигаменти на коляното (ACL/LCL/MCL), руптури на менисците, ОА, нестабилност на пателата

- **Глезен/стъпало:**

Тендинит на Ахилесовото сухожилие, тендинит на м. перонеус, ОА

Гръбначен стълб



- дископатии
- компресионни невропатии

Спортен травматизъм



- Мускули
- Лигamenti
- Сухожилия

Ортопедия



- костни трансплантанти
- лошо заздравели фрактури

PRP и ОА



PRP терапията внася в хондродеструктивната среда високи концентрации от анаболни и хондропротективни цитокини. Освободените от PRP цитокини се насочват към синовиума и индуцират промени в синовиалната течност. Цитокините и растежните фактори могат да преминат от плазмата или синовиалната течност към хондроцитите или субхондралната кост, където се свързват с повърхностни клетъчни рецептори и стимулират клетъчните функции.

Анаболен, антиинфламаторен и изграждащ ефект при ОА



In Vitro

- Стимулира клетъчната пролиферация и продукция на хрущялен матрикс от хондроцитите и hMSC
- Увеличава матриксната секреция от синовиоцитите
- Намалява IL-1 β индуцираното възпаление
- Осигурява благоприятна среда за hMSC
- Фибриногена от PRP се активира до формиране на фибринов матрикс за изпълване на хрущялните лезии

Анаболен, антиинфламаторен и изграждащ ефект при ОА



Преклинични проучвания

- Използвана като гел за попълване на хрущялните дефекти – вариабилни резултати
- Намалява прогресията на изкуствено предизвикани ставни увреди при животински модели – положителни резултати

Анаболен, антиинфламаторен и изграждащ ефект при ОА



Клинични проучвания


- Попълва хрущялните дефекти и увеличава хрущялната регенерация
- Намалява болката
- Подобрява ставната функция
- По-добри резултати в сравнение с Хиалуроновата киселина

PRP – наш опит

Начини за приготвяне на PRP.


- Автоматичен- специално оборудване: центрофуга и епруветки – компютъризирана оптична система отграничава плазмата богата на тромбоцити.

Недостатък: висока цена: центрофуга 1500 – 4500 евро, епруветка за всеки пациент – около 150 евро, по- често в получената плазма попадат повече еритроцити – те увеличават катаболизма и намаляват синтеза на матрикс в сухожилията.



PRP – наш опит

- Мануален - частта от плазмата богата на тромбоцити се определя “на око”. Предимства: може да се използва стандартна центрофуга и епруветки, може да се избегне аспирация на еритроцити в крайната плазма.



PRP – наш опит



- Различна скорост на центрофугиране – G.
- По-ниска скорост: 160-200 G: по-ниска концентрация на тромбоцитите в крайния продукт, но със запазена морфология и по-малък риск от преждевременно активиране.
- По-висока скорост: над 400 G: по-голяма концентрация на тромбоцити, но често с нарушена морфология и преждевременна активация.
- Проучвания сочат като оптимална концентрация на тромбоцити в PRP между 2,5 и 3,5 пъти над средната им в периферната кръв ($142.7 \pm 57.9 \times 10^3/\mu\text{L}$).

При използването на PRP с концентрация на тромбоцити над 3,5 са наблюдавани по-често странични реакции.

Концентрацията на растежни фактори в PRP не е пропорционална на концентрацията на тромбоцитите и е вариабилна между различните пациенти.

PRP – наш опит



Нашият опит е с пациенти с тендонит на ахиловото сухожилие, латерален епикондилит, тендонит на м. супраспинатус и с гонартроза.

Всички пациенти бяха предварително оценени клинично и сонографски – без данни за наличие на възпалителна активност. ПКК с тромбоцити над 180 000 и без данни за анемия или левкоцитоза.


Използувахме еднофазово центрофугиране при ниска скорост – 200 G за 15 минути, стерилни епруветки -4,5 мл с 3,8% цитрат.

27 мл периферна кръв (6 епруветки) за пациент от която бе приготвяна около 3,5 ml PRP.

Инжектирането бе извършвано под ехографски контрол в субстанцията на сухожилието и в перитендона или вътреставно в колянната става чрез преден медиален достъп.

Общото времетраене на процедурата е под 60 минути за пациент.

PRP – наш опыт



PRP – наш опит



- Препоръки към пациента: да не се употребяват НСПВС 2 дни преди и 7 дни след процедурата. Максимално да се обездвижи инжектираната област за 2-3 дни, след което постепенно повишаване на нивото на активност до 6-та седмица.
- Противопоказания: тромбоцитопении, инфекции, хаматологични злокачествени заболявания, постоянна употреба на НСПВС, локално инжектиране на кортикостероид на същото място в рамките на 1 месец, системна употреба на кортикостероиди в предходните 2 седмици.



PRP – наш опит

След центрофугиране се получават три слоя:

- еритроцити(RBCs) - 45%
- ‘*buffy coat*’ (BC) -1%
- горен слой плазма -54%

BC - белезникав цвят, при здрави хора е много тънък, в и непосредствено над него се съдържат основното количество тромбоцити и левкоцити.

Горния слой се аспирира и отделя, след което се аспирира течността 5 мм над BC и до 2 мм под него (около 0,7 мл). Сборът на аспирата от шесте епруветки инжектирахме без допълнителна обработка.



PRP – наш опит



- Предварителни резултати:



След 1 месец при проследените пациенти с латерален епикондилит (3), тендонит на ахиловото сухожилие (2), тендонит на супраспинатус (2) се отчете подобрене на спонтанната и палпаторната болка по VAS с над 50 %.

- Нежелани реакции:

Пациентите съобщаваха за чувство за напрегнатост (но не болка) на мястото на инжектиране в продължение на 2-3 дни.

Една от пациентките с латерален епикондилит разви контрактура на лакътната става, която бе преодоляна с кинезитерапия.

PRP – наш опыт



PRP – наш опит



- **Практически съвети:**

Тромбоцитите отделят растежни фактори, когато са активирани (90 % от РФ се секретират в рамките на 10 мин). Повечето от РФ са с много кратък полуживот.

Колагена и механичната травма са естествени активатори на тромбоцитите.

Вземането на кръв от пациентна и аспирацията на плазмата след центрофугиране трябва да се извършат с игла с по-голям лумен – така се избягва предварителната активация на тромбоцитите.

PRP – наш опит



Практически съвети:

Универсалната величина за ускорение е G , при различните центрифуги тя се постига с различен брой обороти за минута. Използва се формулата:

$$G = (1,118 \times 10^{-5}) \times R \times S^2, \text{ където}$$

R – радиус на ротора

S – брой обороти за минута.

При използваната от нас центрифуга ускорение от 200 G се постига с 1900 оборота за минута.

Благодаря за вниманието

